

Reacciones posteriores a la vacunación

Las vacunas pueden causar reacciones leves posterior a su administración.

Las reacciones mas frecuentes son: dolor, leve hinchazón y enrojecimiento en el sitio de inyección, menos frecuente es la fiebre y malestar general.


El temor a las inyecciones puede provocar ansiedad, por lo que es importante que los niños y niñas sepan que van a sentir un ligero dolor al momento de la vacunación.

Seguridad de las vacunas

Las vacunas son muy eficaces y seguras, cuentan con altos estándares de calidad en su fabricación, lo que está avalado por estudios científicos.

VACUNACIÓN ESCOLAR

Juntos protegemos la salud
de nuestros niños y niñas



LLAME A SALUD RESPONDE

600-360-7777

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Calendario de vacunación escolar

En la etapa escolar, el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud refuerza la protección, administrando a niños y niñas las siguientes vacunas contra enfermedades graves.

Calendario de vacunación escolar

	TRES VÍRICA	dTp ACELULAR	VPH
1° Básico (entre 6 y 7 años)	✓	✓	
4° Básico (entre 9 y 13 años)			✓
5° Básico (entre 9 y 13 años)			✓
8° Básico (entre 13 y 14 años)		✓	

Las vacunas son gratuitas para todos los niños y niñas según edad o curso, tanto para los que se encuentran en el sistema formal y los no escolarizados.

¿Dónde se realiza la vacunación escolar?

La vacunación se realiza en todos los establecimientos educacionales del país, públicos y privados, durante el segundo semestre del año escolar.

Los equipos de atención primaria de salud coordinan fecha y horario con el establecimiento educacional para desarrollar la vacunación.

Si su hijo no asiste a un establecimiento educacional o por alguna razón no recibió la vacuna, puede vacunarse concurriendo a alguno de los vacunatorios públicos y privados en convenio del país.

Vacunas y enfermedades que protegen

Vacuna Tres Vírica

Protege contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (Paperas)

Se previenen las complicaciones que provocan estas enfermedades, que pueden ser graves e incluso llegar a la muerte.

Desde su incorporación en 1990, estas enfermedades han presentado un importante descenso en nuestro país.

La vacuna se administra a los **12 meses y en 1° básico (niños y niñas entre 6 y 7 años)**.

Vacuna dTpa

Protege contra Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva

La **Tos Convulsiva** es una enfermedad respiratoria que puede ser grave e inclusive, causar la muerte en niños pequeños.

Estas enfermedades se evitan con vacunas administradas en la etapa de lactante (menor de 2 años).

Y para mantener la protección se hace necesario administrar refuerzos, vacunando en **1° básico (niños y niñas entre 6 y 7 años)** y posteriormente en **8° básico (niños y niñas entre 13 y 14 años)**.

Vacuna VPH

Protege contra enfermedades causadas por el Virus Papiloma Humano

Existen más de 100 tipos de VPH, que causan desde verrugas genitales hasta distintos tipos de cáncer: cuello de útero, vulva, vagina, pene y ano.

La infección por VPH ocurre principalmente en la adolescencia y edad juvenil, la administración de la vacuna en edades tempranas aumenta la protección.

Se administran 2 dosis de la vacuna, para completar la protección, la primera en **4° básico y la segunda dosis en 5° básico (niños y niñas entre 9 y 13 años)**.